

Analiza epidemiološke situacije gripa u Republici Srbiji

01.02.2010

Analiza epidemiološke situacije gripa u Republici Srbiji na osnovu populacionog nadzora nad oboljenjima slićnim gripu, od 40. izveštajne nedelje 2009. godine do 3. izveštajne nedelje 2010. godine. Kratki pregled za Republiku Srbiju

Od 40. izveštajne nedelje registruje se porast broja slućajeva oboljenja slićnih gripu do 44. nedelje kada incidencija sa 108,81 prelazi prag za epidemijski period. U 45. izveštajnoj nedelji registruje se incidencija 263,75.

Nakon toga do 48. nedelje beleći se pad broja slućajeva oboljenja slićnih gripu, da bi do porasta doćilo u 49. nedelji, sa incidencijom 210,85. U 50. izveštajnoj nedelji beleći se najveća incidencija u posmatranom periodu 266,79. U

sledeće četiri izveštajne nedelje, od 14.12.2009. godine dolazi do pada broja slućajeva oboljenja slićnih gripu, tj. do pad aktivnosti virusa influence. U poslednje tri izveštajne nedelje aktivnost virusa gripa je relativno stabilna sa blagim

porastom aktivnosti u 2. nedelji i blagim padom u 3. izveštajnoj nedelji. U periodu od 41. do 51. nedelje najveća ućestalost obolevanja registruje se u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina. U poslednjih pet izveštajnih nedelja

najveća ućestalost obolevanja, tj. najveća uzrasno specifićna stopa uć registruje se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine.

Do 24.1.2010. godine registrovano je sedamdeset i devet (79) smrtnih ishoda od ove bolesti. Najćeći faktori

rizika identifikovani kod umrlih osoba su dijabetes, kardiovaskularna oboljenja, gojaznost i hronićna oboljenja pluća.

Na osnovu utvrćenog povećanja ućestalosti oboljenja slićnih gripu i na osnovu potvrde pandemijskog soja virusa gripa, prijavljene su epidemije pandemijskog gripa meću stanovnićtvom Jućnobackog, Jućnobanatskog, Severnobanatskog, Sremskog, Severnobackog i Zapadnobackog okruga, Kraljeva, Poćuge, Ućica, Paraćina, Ćećka, Ivanjice, Beograd epidemije u ćkolskim kolektivima u Ćećku, Zajećaru, Ivanjici, Leskovcu, Nićju i Kragujevcu, kao i epidemija u ustanovi za osobe ometene u razvoju u Aleksincu. U posmatranom periodu odjavljene su samo epidemije u ćkolskim

kolektivima, i to u Ćećku, Zajećaru, Ivanjici i Leskovcu. Od 44. do 3. izveštajne nedelje beleći se regionalna

aktivnost virusa gripa. Od 45. do 52. izveštajne nedelje registruje se visok nivo aktivnosti virusa gripa. U poslednje četiri nedelje beleći se nizak nivo aktivnosti virusa gripa. Analiza po uzrasno specifićnim stopama u

uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine najveća uzrasno specifićna stopa je u 50. nedelji sa 563,74. Zatim se u sledećih pet nedelja registruje pad incidencije da bi u 3. nedelji doćilo do povećanja stope (203,21). U uzrasnoj grupi od 5 do

14 godina najveća do sada uzrasno specifićna stopa se beleći u 50. nedelji sa 1097,74. U sledeće četiri nedelje se beleći pad incidencije sa incidencijom od 96,19 u 1. nedelji. U 2. i 3. nedelji beleći se porast uzrasno specifićne stope. U

uzrasnoj grupi od 15 do 29 godina najveća uzrasno specifićna stopa se beleći u 45. nedelji sa 319,91. Do 51. nedelje uć stopa se odrćava od 230,52 u 48. nedelji do 310,81 u 51. nedelji. U sledeće tri nedelje dolazi do pada incidencije i

blagog porasta u 2. izveštajnoj nedelji. U 3. nedelji beleći se neznatan pad uzrasno specifićne stope. U uzrasnoj grupi od 30 do 64 godina, od 40. izveštajne nedelje registruje se porast broja slućajeva oboljenja slićnih gripu do 45.

nedelje sa stopom od 193,40. Nakon toga registruje se smanjenje incidencije do 49. nedelje. Od 51. nedelje beleći se pad incidencije do 3. nedelje (45,94). U uzrasnoj grupi preko 65 godina, uć najveća uzrasno specifićna stopa uć beleći se u 45. nedelji sa 99,61. Nakon toga registruje se smanjenje incidencije do 49. nedelje (60,02). Uzrasno specifićna

stopa u 3. nedelji je 38,72. Stopa je u posmatranom periodu uć bila sve vreme ispod praga za epidemijski period. Laboratorijski nadzor: uć uć uć uć uć uć uć uć Do 24.1.2010. godine potvrćeno je ukupno 690 slućajeva obolevanja od gripa

izazvanog novim tipom virusa A (H1N1). Izvor: www.batut.org.rs